

بشار إسماعيل مصطفى الحيدالي	اسم الطالب
و	عنوان الرسالة
Nurses role as a care giver in coping with mastectomy	
دور الممرض كمقدم عناية تمريضية لتكيف مع المريضات المستأصل ثديهن	

الخلاصة

تهدف الدراسة إلى تقييم الاتجاهات والضغط النفسية في المريضات المستأصل ثديهن . حيث تم اختيار (١٦٧) مريضة وتم تقسيمهن إلى مجموعتين طبقاً لفترة إجراء العملية .
المجموعة الأولى تتكون من (٦٧) مريضاً اقل من ثلاثة اشهر بعد إجراء العملية لاختبار الصحة الذهنية والضغط النفسية (القلق) لدى المرضى . والمجموعة الثانية تتكون من (١٠٠) مريضة اكثر من ثلاثة اشهر فما فوق بعد إجراء العملية لمعرفة الأمل والاتجاهات النفسية (الاكتئاب) لدى المرضى . لقد تم استخدام مقياس تصنيف الأمراض الدولي ومقياس مؤشر الأمل لهيرث في الدراسة . وقد تم تحديد إمكانية الاعتماد على المقاييس عن طريق استخدام الاتساق الداخلي وحساب درجة ارتباط كورنباغ الفا ، حيث جمعت البيانات من (١٠) مرضى . وقد شملت عينة البحث (١٠) ممرضات يعملن في المركز التخصصي لأمراض الثدي ووحدة الجراحة والعيادة الخارجية في مستشفى الأزهر اوي التعليمي ومستشفى الطب الذري في الموصل وذلك لتقييم الحالة الصحية للمرضى . وتم تحديد صحة المقاييس والتأكد منها عبر عرض أداة البحث على (١٠) خبراء في مختلف الاختصاصات أوضحت نتائج الدراسة ان مريضات استئصال الثدي يعانن من ضغوطات نفسية و اضطرابات ذهنية في المجموعة الأولى . بينما يعاني المرضى من اتجاهات نفسية (اكتئاب) في المجموعة الثانية وان مستوى الأمل لديهم مرتفع . وتشير نتائج الدراسة ان للممرضات دور مهم في مساعدة المريضات المستأصل ثديهن . و اعتماداً على النتائج أعلاه فإن الدراسة توصي بضرورة تنقيف النساء على الكشف المبكر للحالة . وتطوير دور مراكز و عيادات الثدي ووضع خطة رعاية لتزويد المرضى بالمعلومات التي تساعدهم للتأقلم مع الحالة .

Abstract

The present study aimed to assess the psychological impact and psychological issues of mastectomy patients. The sample of the study consisted of (167) patients. It is divided into two groups according to time after mastectomy. The first group consisted of (67) patients less than three months after mastectomy used to define the psychological impact and mental health disorder. The second group consisted of (100) patients more than three months after mastectomy used to observe the hope and psychological issues of. The International Classification Disease Scale and Hearth Hope Index were used in the present study. A pilot study was conduct to determine the reliability of the study instruments. The reliability of the scales was determined through the use of internal consistency and calculation Cronbach Alpha Correlation Coefficient when data were gathered from (10) patients. The sample of the study also included (10) nurses who are working at Mosul Breast Center and the Surgical Unit at Al-Zahrawi oncology and Nuclear Teaching Hospital in Mosul. The validity of the scales was determied through a panel of (10) experts in different fields. The results of the present study indicate that the level of psychological impact and mental health disorder are high among the mastectomy patients in group one. Moreover, the psychological issues and hope is high among mastectomy patients in group two. The results also indicate the nurses have an important role in assessing and helping mastectomy patients' health status. Depending on the findings and conclusions of the study, the researcher recommends that mastectomy patients must be educated regarding cancer to provide them with information and to maintain their needs. Also, a plan of care must be designed to cope with the disease. We recommend strengthening the role of breast center and clinics as well.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.