

اسم الطالب	سناء ذنون احمد العثمان
عنوان الرسالة	<i>faction with care for patients with stome satis assessment of quality of life and Nursing</i>
	التقييم التمريضي لنوعية الحياة والقناعة بالعناية المقدمة لمرضى المفاغرة

### الخلاصة

المفاغرة: هي عبارة عن فتحة اصطناعية تجرى في جدار البطن لخروج فضلات الأمعاء الدقيقة او الغليظة وهناك فتحة مشابهة في الجهاز البولي ومن الواضح بان مرضى المفاغرة يواجهون مشاكل متعددة منها فسيولوجية ونفسية واجتماعية في حياتهم اليومية. تهدف الدراسة الى أهمية قيام الممرضة بتقييم العناية بالمرضى وتحسين نوعية الحياة التي يعيشها وكذلك تقييم مدى قناعة المريض بالعناية التمريضية المقدمة له في عيادة المفاغرة كما تهدف الى زيادة معلومات مرضى المفاغرة وتعزيز مهاراتهم وطرق مواجهة المشاكل الصحية وكيفية التعامل مع المرضى الآخرين والمجتمع اجريت هذه الدراسة الوصفية في مستشفى الأورام و الطب الذري في الموصل للفترة من ١/ حزيران / ١٩٩٩ الى ٣١/كانون الاول /١٩٩٩ م . واعتمدت منهجية البحث على دراسة أوربية تنظيمية للبحث وعلاج السرطان اشتملت عينة البحث على ١٠٠ مريض من الحالات المرضية التي تتطلب اجراء المفاغرة وكانت نسبة الذكور ( ٦٢ %) والاناث ( ٣٨ %) من الحالات ومعدل اعمار الذكور بين ( ٤ - ٧٥ ) سنة والاناث ( ٢١ - ٧٠ ) وإشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين متوسط المتحقق او المحسوب وبين المتوسط النظري وهذا يعني ان نوعية الحياة لدى افراد العينة تسير بالجانب الايجابي وكما اظهرت الدراسة نتائج ذات دلالة احصائية عالية من القناعة لدى مرضى المفاغرة حول العناية التي تقدمها الممرضة لهم خلال وجودهم في المستشفى او عيادة المفاغرة . وقد أوصت الدراسة تشجيع الممرضات على الدخول في دورات تدريبية حول العناية التمريضية بمرضى المفاغرة لزيادة معلوماتهم وخبراتهم وتحسين العناية التمريضية المقدمة للمرضى.

### Abstract

For discharge of body waste . the nurse have an important and effective role in the assessment of the quality of life and satisfaction with care for patients . the aim of the study as to assess the quality of life the physical functioning psychosocial unctioning and social functioning the study was performed at oncology and nuclear medicine hospital for a period of six months from 1<sup>st</sup> june till 3ed December 1999 .

The sample of the study inctudes one hundered participants with stama for different underlying diagnosis who were althending ostomg clinic as out patients males from ( 62 % ) and females ( 38 % ) which require stome with age range ( 4 -75) year for moler and ( 21-70 ) years for families .

Result of the study show ahighly significant percentages when compared with orginal European organization for research and treatment of cancer scales ( EORTC – QLQ-C30 ) the patient show high levels of satis faction with care based on the above results this study recommends and encourages the nurse to have training courses in the stama care to improve nursing skills in dealing with stoma patients.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.