

اسم الطالب	سعد حسين مراد مردان العمار
عنوان الرسالة	<i>Nursing assessment of quality of life of amputee patients</i>
	التقييم التمريضي لنوعية الحياة لمرضى البتر

الخلاصة

دراسة وصفية أجريت في مركز الموصل للتأهيل لتقييم نوعية الحياة لمرضى البتر. اشتملت عينات الدراسة على (١٦٠) مريض لديه بتر في الطرف السفلي، يراجعون بصورة دورية مركز الموصل للتأهيل في مدينة الموصل للفترة من ١٠/٤/٢٠٠٤ - ٣١/٦/٢٠٠٤. تم جمع المعلومات باستخدام أداة للتقييم، حيث تكونت الأداة من (٦٦) فقرة موزعة على ثلاثة حقول (المشكلات الجسدية، المشكلات النفسية، المشكلات الاجتماعية). تم تحديد مصداقية وثبات أداة الدراسة و تم التأكد منها عبر إجراء دراسة تمهيدية أولاً وثم عبر عرض أداة البحث على (١٦) من الخبراء في مختلف الاختصاصات. أوضحت نتائج الدراسة أن هنالك العديد من المشاكل في كل نواحي حياة مرضى البتر، وتعد المشكلات النفسية بالمرتبة الأولى التي تواجه مرضى البتر أكثر من باقي المشكلات، بينما المشكلات الجسدية والاجتماعية تأتي تباعاً من حيث المشاكل التي تحدث خلال حياة مرضى البتر. كما تظهر الدراسة أن هنالك فروقات نوعية بين أوجه نوعية حياة مرضى البتر ضمن متغيرات (العمر، الحالة الاجتماعية، التحصيل الدراسي، وموقع السكن). واعتماداً على النتائج أعلاه فإن الدراسة توصي بإنشاء مراكز متخصصة لضحايا الحرب، كذلك اعتماد برامج تدريبية كمشاغل وورش للتأهيل المهني والعلاجي، وبرامج تدريبية معدة لعوائل مرضى البتر حول توفير الرعاية وتحسين نوعية حياتهم.

Abstract

A descriptive study was carried out at Al-Mosul Rehabilitation Center to assess the quality of life of amputee patients. The sample of the study consisted of 160 amputee patients; The sample was chosen for the period from 10th April to 31st June 2004. The data was collected by using assessment tool that consisted of (66) items distributed to three domains (physical, psychological and social). The validity and reliability of the study tool was done by conducting preliminary study and presenting it to (16) experts in different fields. The result of the study shows that there are many problems in all areas through the amputee patient's life. The psychological problems come first in rank among problems faced by amputee patients, while the physical and social aspects come later throughout the amputee patient life. The study also revealed that there are significant differences between the quality of life domains and variables of age, social status, level of education and urban city. the researcher recommends to establish rehabilitation centers to accommodate war victims; training program should be carried out in special workshop for vocational rehabilitation therapy and educational programs for families of amputee patients for care to provide and improve quality of their life.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.